

Michael J. Benjamin, MD, FACOG

7777 North University Drive, Suite 102

Tamarac, FL 33321

Horario: Lunes - Viernes 8:30am – 5:30pm y Sabados 8am – 12pm

Ph: (954) 720-7777 | Fax: (954) 726-2896

Despues de esas horas, para **Emergencia Solamente**, llama: 954-790-7770

Proceso de Aborto Usando Medicamentos Mifeprex/Misoprostol

Por favor lea estas formas con cuidado y complete y firme todos los papeles antes de su examen. Es necesario que presente una identificación valida, con su foto.

Despues de completar sus documentos, se le hará un ultrasonido para documentar la fecha de su embarazo. El aborto sin cirugía solo es posible en las primeras 10 semanas de gestación, de acuerdo con las fechas determinadas por nuestro ultrasonido HOY. Despues de 10 semanas, un aborto quirúrgico es permitido hasta las 24 semanas de gestación en el estado de la Florida.

Una vez completados el ultrasonido y sus exámenes de laboratorio, el proceso se le explicara, en detalle, y usted podrá comenzar el proceso de aborto. Si usted decide proceder, se le entregara una (1) pastilla de Mifeprex, y un vaso de agua, con el cual tomarla. Esta dosis se toma en nuestra oficina, y se documentara. No consuma alcohol en las siguientes 72 horas. Se le entregara una botella con tres (3) pastillas de Misoprostol, para llevarse a su casa. Planifique quedarse en casa el siguiente día.

Mifeprex (RU-486) Tomado oralmente en: Fecha: _____ a las _____ am/pm

La proxima mañana, coma algo ligero y comience a tomar sus medicamentos

Una hora antes de tomar el Misoprostol, tome la pastilla recetado para el dolor (Tylenol III).

Insertar Misoprostol bucalmente en: Fecha: _____ a las _____ am/pm

Aproximadamente 24 horas despues que tomo el Mifeprex, usted debe comenzar la segunda etapa de medicamentos, utilizando el Misoprostol que se le entrego. **Una hora antes de tomar el Misoprostol, tome el medicamento que se le ha recetado Tylenol III. Despues de una hora:** Usted debe colocar las cuatro (4) tabletas de Misoprostol 200 mcg entre su cachete y encías para que se disuelvan. Usted puede tragar normalmente mientras que se disuelven, pero no trague las pastillas enteras, y no las escupa. Usted puede tener **sangramiento abundante y colicos intensos con dolor fuerte** en las horas despues que disuelvan las pastillas de Misoprostol. Puede usar toallas higiénicas tipo MAXI (NO TAMPONS). Los cólicos pueden llegar a ser muy fuertes, y traerle mucho dolor. El medicamento para el dolor (Tylenol III #6, si no es alérgica a el) se le recetara para aliviar el dolor. Puede que se lo alivie, pero no quitárselo por completo. Tómelo según las instrucciones. El sangramiento puede ponerse muy abundante, y dolor puede que sea muy severo. Los dos deben gradualmente disminuirse o desaparecer en unas horas.

SU CITA DE SEGUIMIENTO ES: Fecha: _____ a las _____ am/pm

Llame al 954-720-7777 si tiene uno de los siguientes síntomas:

- **Empapando dos (2) or mas** toallas higiénicas tipo MAXI por dos (2) horas consecutivas
- **Fiebre sostenida** (temperatura mas de 101.0 grados Fahrenheit) **o fiebre que comience despues de utilizar el Misoprostol**
- Dolor abdominal o molestia, “sintiéndose enferma” incluyendo débil, nausea, vomito o diarrea mas de 24 horas despues de utilizar Misoprostol.

Yo he recibido, leído y comprendido las instrucciones de esta hoja. Yo me comprometo a tomar los medicamentos como he sido instruida. Comprendo que debo estar presenta en una cita de seguimiento, y lo hare.

Firma de Paciente

Fecha

Firma de Testigo (Staff Witness)

Fecha